


JOSKUIER VAN TETS (*Zonker*) je vrlo zanimljiva sorta jer rano dozrijeva i ima lijepe velike grozdove koji se lagano beru. Grmovi su bujni, a redovito i obilno rode. Bobe su vrlo velike, intenzivno crvene boje, a odlične kvalitete za industrijsku preradu i prerađuju se u domaćinstvima. Sok je slatkokiseo, a ima dobro izražen ugodan miris. Ova se sorta puno cijeni za industrijsku preradu.

Red Lake

RED LAKE (*Red leik*) je srednje bujna do bujna, vrlo rodna sorta. Otporna je prema niskim temperaturama i bolestima. Kasno cvate. Grozdovi su vrlo lijepi s velikim bobama ujednačene veličine. Bobe su veoma lijepo obojene, a lako se beru. Okus soka je slatkokiseo, a ima dobro izražen ugodan miris. Ova se sorta puno cijeni za industrijsku preradu.

Sustav uzgoja, gustoća sklopa i rez crnog i crvenog ribiza


Crni i crveni ribiz najčešće uzgajamo u obliku grma. Sadnja se obavlja s dobro razvijenim i zdravim sadnicama, na kojima je dobro razvijena i razgranata korijenova mreža. Sadi se u jesen ili u proljeće. Kod nas se smatra da je najbolje sadnju obaviti u drugoj polovici mjeseca listopada. S obzirom da se uzgaja u obliku grma, preporučuje se saditi između redova na razmak od 2,5 do 3,0 m, a u redu od 1,5 do 2 m. Kod špalirnog (plošnog) uzgoja, preporučuje se između redova uzimati razmake od oko 3 m, a u redu 1,3 m. Razmaci sadnje određuju se prema bujnosti sorte, plodnosti tla, mehanizaciji itd. Kod sadnje je potrebno obaviti prereze na mjestima gdje je deblje korijenje iskidano. Nakon sadnje se sadnice prikrate na visini od 15 do 20 cm. Kako se ribiz oblikuje vidi se na crtežima br. 109 i 110.



Crtež 109. Oblikovanje grma crnog ribiza

Rez ribiza

Ribiz najbolje rodi na jednogodišnjim, dvogodišnjim i trogodišnjim šibama, odnosno, na jednogodišnjim izbojima, koji predstavljaju ogranke dvogodišnjih i trogodišnjih šiba. Četverogodišnje i starije šibe slabo rode, daju sitne plodove, a najčešće se suše. Stoga treba nastojati da se rezidbom na grmovima zadrži $\frac{1}{3}$ jednogodišnjih, $\frac{1}{3}$ dvogodišnjih i $\frac{1}{3}$ trogodišnjih šiba. Na taj se način može održavati ravnoteža između rasta i rodnosti, kao i sukcesivno obnavljanje i održavanje grmova u stanju dobre rodnosti i bujnosti. Crni ribiz rijetko (samo neke sorte) daje rod na četverogodišnjim šibama. Međutim, u nekih sorti crvenog ribiza slabije se i manje razvijaju jednogodišnji izboji. Zbog toga ih treba obilnije gnojiti mineralnim (posebice dušičnim) gnojivima i stajskim gnojem. Kod ovih sorti se prema tome, da se postigne veća ukupna rodnost, katkada može zadržati u grmu i po koja četverogodišnja šiba.



tež 110. Grm ribiza i rez